FICHE TECHNIQUE

FANGA B+ : (Pâte molle bleue à 0.001% (0.01g/kg) de Brodifacoum et 0.005% (0.05g/kg) de Dénatonium Benzoate)

N°AMM : 2000323

Selon le règlement UE 453/2010 modifiant l'annexe II de la directive REACH 1907/2006/CE, Art 31 publié le 30/01/06 (journal officiel L396) et selon le règlement 1272/2008

1- IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom homologué : FANGA B +

AMM : N° 2000313 du 1er décembre 2000

1.3. Renseignement concernant le fournisseur de la fiche technique :

FRANCE FLUIDES
ZONE INDUSTRIELLE DES TOURONDES
BP 100
82302 CAUSSADE CEDEX
Tél. : 05 63 27 16 57
FAX : 05 63 03 75 31
e-mail: contact@france-fluides.com
www.france-fluides.com

Composition : Brodifacoum (CAS 56073-10-0) = 0,001% ou 0,01g/kg
Dénatonium benzoate = 0,005% ou 0,05g/kg

Type de formulation : Biocide - RB appât prêt à l'emploi sous forme de pâte molle bleu.

Type d'action du produit : Rodonticide (TP14)

Usages homologués : Lutte contre les rongeurs : rats, souris, loirs, lérots.

2- CARACTERISTIQUES DU PRODUIT COMMERCIAL

2.1 Indication:

Appât rodonticide anticoagulant prêt à l'emploi.

2.2 Présentation :

Sachet de 10 g de pâte fraîche bleue prête à l'emploi.

2.3 Emballage :

Pâte en sachet de 8 à 10 g logés en boite de 250, 500 ou 1 500 g, caisses américaines de 20kg.

2.4 Mode d'emploi :

Porter des gants appropriés, ne pas toucher les appâts directement avec les doigts.
Déposer dans des postes d'appâtage : 3 sachets pour des souris et 18 pour des rats. Espacer les postes de 1 à 2 mètres pour des souris et de 5 à 6 mètres pour des rats.
Les postes doivent être placés le long des chemins empruntés par les rongeurs et dans les endroits les plus fréquentés. Contrôler les postes après deux semaines, les compléter si nécessaire. Contrôler à nouveau 3 semaines après la seconde application. Ramasser les sachets restants, les détruire conformément à la règlementation en vigueur. Ramasser les cadavres, les enterrer ou les envoyer à l'équarrissage (à partir de 40kg). Se laver des mains avec du savon en cas de contact avec la peau.

Tél : 05 63 27 16 57 Fax : 05 63 03 75 31 Email : contact@france-fluides.com

Les symptômes apparaissent 36 h après l'ingestion et les rongeurs meurent en 4 à 10 jours.

2.5 Recommandations

Disposer 3 à 10 sachets par poste aux endroits fréquentés par les rongeurs selon la taille des animaux à détruire. Renouveler jusqu'à l'arrêt de la consommation. Utilisation possible en tout lieu, même humide.
Equipez vous de gants, déposez 3 à 10 sachets sur le passage des rongeurs, selon la taille des animaux à réduire (3à5 pour souris, jusqu'à 10 pour les rats). Placez des sachets tous les 5 à 10 mètres, selon l'importance du nombre de rongeurs à détruire. Protégez les sachets (en utilisant des boîtes à appâts) pour :
Maintenir l'appât à l'abri de la poussière, procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide. Contrôler chaque jour les appâts, compléter ou renouveler les sachets au fur et à mesure de leur consommation. Lorsque les appâts ne sont plus consommés, la dératisation est totale.

3- CARACTERISTIQUES ECOTOXICOLIGIQUES DES APPATS

3.1 Choisir le type d'appât après avoir étudié attentivement le milieu ou celui ci doit être placé.

C'est à dire :

a) Par rapport aux rongeurs nuisibles :

- Relevé des parcours et des nids actifs.
- Relevé des sites ou ils séjournent.
- Relevé des sites d'alimentation
- Relevé des foyers d'infestation

b) Par rapport aux autres animaux :

- Identification du type d'animal.
- Relevé du type et des sites d'alimentation.
- Relevé des sites où ils séjournent.

3.2 Choisir l'appât alimentaire en tenant compte que :

- La souris domestique (Mus musculus) a un régime alimentaire omnivore et a une préférence pour les gâteaux, les fruits, le beurre, le fromage, le lard.
- Le rat brun (Rattus norvegicus) a un régime alimentaire omnivore, se nourrit de détritus mais a une nette-préférence pour un régime protéique, viande, poisson, fromage, lait, huiles et graisse.
- Le rat noir (Ratus ratus) a un régime alimentaire omnivore, mais à préférence granivore.

3.3 Placer les appâts :

- Le plus scrupuleusement possible. Utiliser des postes d'appâtage.
- Disposer les appâts en quantité suffisante par rapport à la densité de population animale présente.
- Un sous appâtage peut provoquer une apparente résistance : éviter d'employer des quantités qui ne soient pas mortelles.

3.4 Emplacement :

- Choisir l'emplacement du produit en tenant compte du fait qu'il est destiné aux rongeurs et qu'il ne doit être consommé que par ces derniers.
- Cacher les appâts à l'intérieur de tuyaux ou les recouvrir avec des tuiles ou des caisses.
- Utiliser « des postes d'appâtage » prévus pour les rongeurs.
- Placer les appâts dans des zones accessibles uniquement aux rongeurs, etc.

Tél : 05 63 27 16 57 Fax : 05 63 03 75 31 Email : contact@france-fluides.com

4 - INFORMATION MEDICALE :

Action du principe actif : La substance active contenue dans le produit est un anticoagulant, elle a une action antivitaminique K.
Symptômes : Un empoisonnement important par ingestion inhibe la vitamine K, provoquant des hémorragies cutanées et des muqueuses. L'action sur d'autres systèmes ou appareils est d'ordre hémorragique.
Antidote : Vitamine K1 administrée sous contrôle médical.
Contre-indication : Anticoagulant
Compte tenu de la gravité des hémorragies qui peuvent survenir suite à une ingestion chez l'animal et en particulier chez l'animal domestique, la vitamine K1 peut être administrée même en l'absence de signe d'altération de la coagulation.
Liste des 10 centres anti- poisons : INRS 01 45 42 59 59

5 - ETIQUETAGE ET CLASSIFICATION :

Préparation : FANGA B + - préparation à 0.001% de brodifacoum

Xn	Nocif
R22	Nocif en cas d'ingestion
S 1/2	Conserver sous clé et hors de portée des enfants
S 13	Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux
S 20/21	Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
S 35	Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage.
S 44	En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
S 49	Conserver uniquement dans le récipient d'origine

Etiquetage réglementaire supplémentaire :
Mentions complémentaires à porter sur l'étiquette :
Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.
Ne peut être utilisé que dans les lieux ou abris couverts.
Ne pas réutiliser les emballages vides
Dangereux pour les chiens et les chats.
Antidote vitamine K1
En cas d'urgence appeler le centre anti poison le plus proche tel : 01 45 42 59 59
Ne pas polluer l'eau ou avec le produit ou son emballage.
Ne pas traiter sur un terrain en risquant un entraînement vers un point d'eau : ruisseau, étang, marre, puits… en particulier si le terrain est en pente.
Les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils observent toute législation locale, régionale ou nationale applicable.
Avant toute utilisation, lire soigneusement la Fiche de sécurité et l'étiquette.

Tél : 05 63 27 16 57 Fax : 05 63 03 75 31 Email : contact@france-fluides.com